


LES AVORTEMENTS : RESTEZ VIGILANTS

AVORTEMENT : 1 mois de gestation → 2 jours après la naissance

Déclaration obligatoire dès 1 avortement

Visite + déplacement vétérinaire = 100 % pris en charge par l'état



	SIGNES ET CRITÈRES DE SUSPICION	PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES	Prise en charge
BRUCELLOSE	Avortements, fièvre, signes cutanés <i>Zoonose</i>	Sang, sérologie (Ac)	100 % ETAT
BVD	<ul style="list-style-type: none"> Indicateurs BVD + Troubles immunitaires sur le troupeau avec pertes de production 	Sang, sérologie (Ac) sur femelle avortée + 6 vaches à problèmes	100 % GDS
FIÈVRE Q	Métrites, infertilité, avortement	Écouvillon utérin, PCR sur femelle avortée + sang (Ac) sur 6 vaches à problèmes	100 % GDS
NÉOSPOROSE	<ul style="list-style-type: none"> Avortements en « familles » Présence de chiens sur l'exploitation 	Sang, sérologie (Ac) sur femelle avortée + 6 vaches à problèmes ou même famille	100 % GDS
VIRUS DE SCHMALLEMBERG	<ul style="list-style-type: none"> Avortements Malformations nouveau-né : Arthrogrypose (articulations bloquées) Malformation colonne vertébrale et tête 	Signes cliniques caractéristiques Déclarer auprès du GDS	
LISTÉRIOSE	A rechercher en cas d'avortement et production de lait cru	Écouvillon utérin, fœtus (bactériologie)	Au cas par cas : Consulter le vétérinaire du GDS et votre vétérinaire pour la prise en charge
LEPTOSPIROSE	<ul style="list-style-type: none"> Présence de rongeurs ou eau stagnante Signes cutanés fréquents 	Urine (sang), PCR, sur femelle avortée + sang vaches à problèmes	
SALMONELLOSE	A rechercher en cas d'avortement et production de lait cru	Écouvillon utérin, fœtus (bactériologie)	
EHRlichiose	<ul style="list-style-type: none"> Saisonnalité Transmission par les tiques 	Sang (PCR) femelle avortée + sang (Ac) vaches à problèmes	
MYCOTOXINE	Suspicion aliment contaminé	Aliment	
BHV-4	<ul style="list-style-type: none"> Signes respiratoires souvent associés Souvent concomitant à autre pathologie 	Écouvillon vaginal femelle avortée + vaches à problèmes	

Ovin/Caprin : Dès 3 avortements : prise en charge visite vétérinaire + analyses = 100 % ETAT

Protocole GDS : Chlamydirose, Toxoplasmose, Listériose, Salmonellose et fièvre Q

En cas de troubles de la fertilité et/ou d'avortements à répétition, y compris retours en chaleur décalés, il est recommandé de contacter votre vétérinaire et le vétérinaire du GDS, pour réaliser une visite d'élevage conjointe. Des investigations complémentaires pourront être proposées.