



SOINS AU NOUVEAU-NE

Réanimation (si besoin)

Le principe est d'intervenir le plus rapidement possible (concept de l'heure d'or) pour éviter les séquelles. Traiter chaque veau ayant subi un vêlage difficile comme un veau compromis.

Immédiatement après la naissance :

- Verser de l'eau froide sur la tête.
- Éventuellement suspendre le veau, pendant une minute maximum, par les pattes arrière.
- Aspirer les mucosités du nez et de la bouche et si besoin assister le veau sur le plan respiratoire.
 - ◇ Un appareil dédié à la réanimation des veaux (aspiration des mucosités et insufflation d'air) est à la fois beaucoup plus efficace et hygiénique qu'une opération manuelle par vous-même (contacter GDS services ou votre vétérinaire pour plus d'informations).
- Masser le veau énergiquement avec de la paille pour le stimuler et l'inciter à se redresser correctement.
- Mettre en œuvre une perfusion lente : soluté bicarbonate ou MulthydrilND ou équivalent (voir impérativement avec votre vétérinaire au préalable).



Gestion de la douleur : un vêlage difficile entraîne de la douleur. Cette douleur provoque une réduction de la vitalité et de la viabilité du veau nouveau-né. Elle peut être gérée par des anti-inflammatoires adaptés au jeune veau (voir avec votre vétérinaire pour plus d'informations).

Médicaments pour stimuler la respiration (DOPRAM[®], RESPIROT[®]) ou oxygéner le cerveau (CANDILAT[®]) : à ne pas utiliser avant d'avoir évacué les mucosités des naseaux et de la bouche

Sur prescription vétérinaire.

Demandez les conseils d'utilisation à votre vétérinaire.

Séchage du veau

- Laisser la mère lécher son veau ou à défaut le sécher avec des chiffons.
- Si le veau a besoin d'être réchauffé, le placer à côté de bouillottes (bidons plastiques remplis d'eau chaude et placés sous une bonne couche de paille) ou sous une lampe infra-rouge. **Ne pas surchauffer le veau.**



Administration de colostrum

Voir la fiche correspondante spécifique au colostrum.

Hygiène du nombril

Préalable : litière du box de vêlage propre et sèche.

Vider le cordon du sang en le pressant avec les doigts très propres (utiliser de préférence un gant à usage unique) de haut en bas,

Tremper avec produit iodé type VETEDINE[®], ou NUTOMBYL[®], ou teinture d'iode 1 fois par jour, à renouveler tant que le nombril n'est pas sec (voir avec votre vétérinaire pour le protocole précis).

Voir avec votre vétérinaire pour le traitement médical des gros nombrils (protocoles de soins).

L'infection du nombril doit parfois être traitée chirurgicalement par le vétérinaire.

L'infection du nombril peut rester localisée ou se généraliser (abcès foie, arthrite, méningite, tétanos, septicémie...)