

# Paratuberculose

01

## Description

- Bactérie
- **Très résistante** : Jusqu'à 1 an dans le milieu extérieur

02

## Symptômes

**Très peu de cas clinique mais beaucoup de vaches excrétrices**

- Baisse de production
- Infertilité
- Sensibilité aux maladies
- Amaigrissements
- Diarrhées
- Mortalité

03

## Transmission

- Introduction d'un animal contaminé



Dépistage avant le départ + transport sécurisé  
Dépistage sérologique et/ou PCR, selon âge de l'animal et statut de l'élevage d'origine  
Achat dans des cheptels à **situation favorables** ou **indicateurs négatifs**

- Matériel contaminé



Nettoyage et désinfection du matériel partagé avec d'autres élevages  
Pédiluve à l'entrée de l'exploitation

04

## Que faire ?

05

## Si l'élevage est infecté?

- Dépistage des animaux de + 24 mois en sérologie
- Isolement et élimination des animaux excréteurs
- Réduction de la contamination

Box de vêlage

Alimentation des veaux avec lait pasteurisé ou en poudre,

Pas d'épandage des lisiers/fumiers sur les pâtures

Chaulage des sols si nécessaire

Accès aux rivières et mares limité

- **Renforcement de l'immunité du troupeau**

Administration systématique du colostrum sain au veaux

Équilibrer les rations et éviter les carences

Bonne préparation au vêlage

Maîtrise raisonnée du parasitisme

